

ميغاميلاز®

ألفا - أميلاز 3000 وحدة CEIP/قرص
قرص مغلف

التكوين النوعي و الكمي

ألفا-أميلاز.....3000 وحدة CEIP*

لقرص مغلف

*أي 2142,9 وحدة دستور الصيدلة الأوروبي.

سواغ: ستيرات المغنيزيوم، سوربيتول، صمغ لك، كبوليمار
ميثاكريلات قلويات، (E100 Eudragit)، طلق، جيلاتين،
سكروز، صمغ عربي، ثاني أكسيد التيتان، أصفر برتقالي S،
شمع كرنوبية، شمع لينيت.

قائمة السواغ التي يجب معرفتها من أجل استعمال
آمن عند بعض المرضى
أصفر برتقالي S (E110)، سكروز، سوربيتول.

المشكل الصيدلاني

أقراص مغلفة، علب ذات 24 قرص.

الفئة الصيدلانية و العلاجية

أنزيمات مضادة للالتهاب

(R: النظام التنفسي)

صاحب مقرر التسجيل

مخابر TOP PHARM

Domaine de Mont Causson
BP 50, 31250 REVEL

اسم و عنوان المستقل

TOP PHARM

Domaine de Mont Causson
BP 50, 31250 REVEL

الصانع:

ROTTENDORF PHARMA

Z.I. n° 2 de Prouvy - Rouvignies.

1, rue de Nungesser 59121 PROUVY. France.

معلم من طرف:

Pharmaceutical Laboratory International (PLI)

10, Route de Aïn Benian - Chéraga - Alger

حالات استعمال هذا الدواء

يستعمل هذا الدواء في حالة آلام خفيفة في الحلق و دون حمى
لللكبار.

حذار!

حالات عدم استعمال هذا الدواء

لا يجب استعمال هذا الدواء في حالة:

- سوابق حساسية لألفا-أميلاز أو أحد مركبات القرص.
في حالة الشك، يستلزم استشارة الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات الاستعمال

يوجد على شكل شراب للأطفال.

في حالة حمى و/أو ظهور اضطرابات جديدة (آلام حادة في
الحلق أو في الرأس، نخامة قيحية، انزعاج عند ابتلاع الغذاء...)

استشر الطبيب.

لا تستعمل هذا الدواء بصفة مطولة دون رأي الطبيب.

في حالة شك، لا تتردد في طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

تفاعلات طبية و تفاعلات أخرى

من أجل تجنب تفاعلات محتملة بين عدة أدوية، يجب ابلاغ
الطبيب أو الصيدلي بأي علاج جاري.

الحمل - الرضاعة

لا يستحسن تناول هذا الدواء خلال الحمل.

إذا اكتشفت أنك حامل خلال العلاج، استشيري الطبيب لأنه
الوحيد الذي بإمكانه الحكم على ضرورة مواصلة العلاج.

بصفة عامة، يجب خلال الحمل و الرضاعة استشارة الطبيب أو
الصيدلي قبل تناول الدواء.

كيفية تناول هذا الدواء

المقدار

مخصص لللكبار

يوجد على شكل شراب للصفار.

- قرص واحد، 3 مرات في اليوم خلال الوجبات.

نمط و طريقة الاستعمال

عبر الفم.

ابتلع الأقراص دون قضمها مع كأس من الماء.

مدة العلاج

لا تستعمل هذا الدواء بصفة مطولة دون رأي الطبيب.

تأثيرات غير مرغوب فيها و مزعجة

ككل مستحضر فعال، يمكن أن يسبب هذا الدواء تأثيرات نوعا

ما مزعجة:

- حساسية: في هذه الحالة أوقف العلاج.

ابلاغ الطبيب أو الصيدلي بكل تأثير غير مرغوب فيه أو مزعج

لم يتم ذكره في دليل الاستعمال هذا.

الحفظ

لا تتجاوز تاريخ الاستعمال المحدد على الغلاف الخارجي.

احتياطات خاصة للحفظ

يحفظ في درجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية.

رقم مقرر التسجيل: 15/00/04 C 026/104

تاريخ تحديث دليل الإستعمال بالجزائر

ديسمبر 2015.

MÉGAMYLase®

Alfa-amylase 3000 U.CEIP/cp
COMPRIMÉS ENROBÉS

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

ALFA-AMYLASE..... 3000 U.CEIP•
pour un comprimé enrobé

* soit 2142,9 unités Pharmacopée Européenne.

Excipients : stéarate de magnésium, sorbitol, gomme laque, copolymère de méthacrylate alcalin (eudragit E100), talc, gélatine, saccharose, gomme arabique, dioxyde de titane, jaune orangé S, cire de carnauba, cire de lignite.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE:
Jaune orangé S, Sorbitol, Saccharose.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés enrobés, boîte de 24.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
ENZYMES A VISÉE ANTI-INFLAMMATOIRE
(R: Système Respiratoire)

DETENTEUR DE LA D.E. :

Laboratoire TOP PHARM
Domaine de Mont Causson
BP 50, 31250 REVEL

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

TOP PHARM.
Domaine de Mont Causson, BP 50, 31250 REVEL

FABRICANT :

ROTTENDORF PHARMA
Z.I. n° 2 de Prouvy - Rouvignies.
1, rue de Nungesser 59121 PROUVY. France.

CONDITIONNÉ PAR :

Pharmaceutical Laboratory International (PLI)
10, Route de Aïn Benian
Chéraga - Alger

DANS QUELS (S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre de l'adulte.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant :

- Antécédents d'allergie à l'alfa-amylase ou à l'un des composants du comprimé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il existe une forme sirop plus adaptée à l'enfant.

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments ...) Consultez votre médecin.

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

RÉSERVÉ À L'ADULTE

Il existe une forme sirop plus adaptée à l'enfant.

- 1 comprimé, 3 fois par jour au cours des repas.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Avaler les comprimés, sans les croquer, avec un verre d'eau.

DURÉE DU TRAITEMENT

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS:

- réactions allergiques : dans ce cas arrêtez le traitement.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

N° de D.E. : 15/00/04 C 026/104

Date de mise à jour de la notice en Algérie :
Décembre 2015.